

A **Bolzano-Weierstrass-tételkör** és a hozzá kapcsolódó állítások  $\mathbf{R}^n$  jellegzetes topológiai tulajdonságaira mutatnak rá. Lényegében a korlátos és zárt halmazok kompaktságáról szólnak.

## Tartalomjegyzék

- 1 Sorozatkompaktság és B-W-tétel
- 2 Kompakt halmazok és H-B-tétel
  - ◆ 2.1 Cantor-tétellel
  - ◆ 2.2 Bolzano-Weierstrass-tétellel
  - ◆ 2.3 Kapcsolatok

## Sorozatkompaktság és B-W-tétel

A Bolzano-Weierstrass-tétel az úgy nevezett sorozatkompaktság fogalmával kapcsolatban kulcsfontosságú tényre mutat rá. Az említett fogalom a következő.

Egy  $K$  részhalmaz **sorozatkompakt**  $\mathbf{R}^N$ -ben (vagy még általánosabban egy  $M$  metrikus térben), ha minden a  $K$ -ban haladó sorozatból kiválasztható  $K$ -beli határérték konvergens részsorozat. Jelemben:

$$K \text{ sorozatkompakt} \iff_{\text{def}} \forall (a_n) \in K^{\mathbf{Z}^+} \exists (n_k) \in (\mathbf{Z}^+)^{\mathbf{Z}^+} \quad (n_k) \text{ indexsorozat} \wedge \exists \lim(a_{n_k}) \in K$$

A konvergens részsorozatra vonatkozó tétel  $\mathbf{R}^N$ -ben:

**BOLZANO-WEIERSTRASS-FÉLE KIVÁLASZTÁSI TÉTEL.** Korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítását külön nézzük az egy és a többváltozós esetre.

## Kompakt halmazok és H-B-tétel

A metrikus terek analízisének egyik jelentős eredménye, hogy a sorozatkompaktság és a topologikus kompaktság fogalma egybeesik. Alább a topologikus kompaktsággal és az azt motiváló tétellel, a Heine-Borel-tétellel (vagy más elnevezéssel Borel-Lebesgue-tétellel) foglalkozunk.

**Kompakt** egy  $K$  halmaz, ha minden nyílt halmazrendszerből, melynek uniója lefedi  $K$ -t kiválasztható véges sok nyílt halmaz is, melyek véges uniója még mindig lefedi  $K$ -t.

**HEINE-BOREL-TÉTEL.**  $\mathbf{R}^N$ -ben korlátos és zárt halmaz kompakt.

## Cantor-tétellel

A Cantor-féle közszerésztétel egy ekvivalens megfogalmazását fogjuk használni. Eszerint, ha  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$   $\mathbf{R}$ -beli korlátos és zárt halmazok olyan nemüres rendszere, hogy minden  $\alpha \in A$  indexre létezik olyan  $\beta \in A$  index, hogy  $F_\beta \subset F_\alpha$  (azaz lefelé irányított), akkor az  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  halmazrendszer metszete nem üres.

## Bolzano-Weierstrass-tételkör

Jelölje  $A$  az  $I$  véges részhalmazainak halmazát és legyen tetszőleges  $A$ -ra:

$$F_\alpha := K \setminus \bigcup_{i \in \alpha} \Omega_i$$

Ekkor a  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  halmazrendszer olyan, hogy minden eleme korlátos és zárt  $\mathbf{R}$ -ben és tetszőleges  $A$ -ra a  $F := \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$  elem olyan, hogy  $F = \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ . A tételt azt igazolná, ha belátnánk, hogy van olyan  $\alpha \in A$ , hogy  $F_\alpha \neq \emptyset$ , ugyanis ekkor

$$K \subseteq \bigcup_{i \in \alpha} \Omega_i$$

teljesülne.

Ha  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  minden eleme nemüres volna, akkor a Cantor-axióma fenti alakjából következne, hogy

$$\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha \neq \emptyset$$

ami ellentmondás, hiszen  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  definíciójából és a halmazkivonásra vonatkozó de-Morgan-szabályból következik, hogy

$$\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha = K \setminus \bigcup_{\alpha \in A} \left( \bigcup_{i \in \alpha} \Omega_i \right) = K \setminus \bigcup_{i \in I} \Omega_i = \emptyset$$

Tehát van  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$ -nak olyan eleme, mely üres, és az ezt indexez  $\alpha \in A$ -val a  $(\Omega_i)_{i \in \alpha}$  a kívánt tulajdonságú lefedés lesz.

## Bolzano-Weierstrass-tétellel

Mivel  $\mathbf{R}$  teljesíti a második megszámlálhatósági kritériumot, azaz van megszámlálható környezetbázisa (például a racionális végpontú nyílt intervallumok ilyen alkotnak), a  $K$  korlátos és zárt halmazt lefedő rendszerből kiválasztható megszámlálható részlefedés. Legyen ez  $(I_n)_{n \in \mathbf{N}}$ . Definiálunk egy  $K$ -ban haladó  $(x_n)$  sorozatot. Ha  $I_1$  lefedti  $K$ -t, akkor megtaláltuk a véges részlefedést. Ha  $I_1$  nem fed le  $K$ -t, legyen  $x_1 \in K \setminus I_1$ . Ha  $I_1 \cup I_2$  már lefedti  $K$ -t, akkor szintén megtaláltuk a véges részlefedést. Ha nem, legyen  $x_2 \in K \setminus (I_1 \cup I_2)$ . Így folytatva biztos lesz olyan  $n$ , hogy  $(I_n)_{i=1}^n$  már lefedti  $K$ -t. Tegyük fel ugyanis, hogy nem fedné le. Akkor  $(x_n)$  egy végtelen,  $K$ -ban haladó sorozat lenne, aminek a Bolzano-Weierstrass-tétel szerint lenne  $u \in K$  sűrűsödési pontja. Mivel  $(I_n)_{i=1}^n$  lefedti  $K$ -t ezért  $u$ -t is tartalmazza egy  $I_m$  nyílt halmaz.  $u$ -nak van  $I_m$ -be eső nyílt környezete, és ebben a környezetben végtelen sok  $(x_n)$ -beli tag.  $(x_n)$  konstrukciója szerint minden  $n$ -re  $(I_n)_{i=1}^n$ -ben csak véges sok tag lehet. Ez azonban ellentmond annak, hogy már magában  $I_m$ -ben is végtelen sok tag van.

Tehát a véges nyílt lefedés kiválasztásának fenti konstrukciója véges sok lépésben véget ér (bár, hogy mi lesz ez a szám, előre nem tudjuk megmondani sehogyan sem; sőt, már magát  $(I_n)_{i=1}^n$  sem fogjuk tudni megadni konstruktívan, kézzelfogható módon).

## Kapcsolatok

$\mathbf{R}^n$ -ben tehát a kompaktság ugyanaz, mint a sorozatkompaktság.

## Bolzano-Weierstrass-tételkör

$\mathbf{R}^n$  véges dimenziósága nagyon lényegesen hozzájárul a fenti tételek fennállásához. Általában (Hausdorff-térben) kompakt halmaz korlátos és zárt. Ám, van olyan végtelen dimenziós normált tér, melyben zárt és korlátos halmaz nem kompakt. Legyen ugyanis  $\ell_\infty(\mathbf{R})$  a korlátos sorozatok tere. A téren a norma a suprémum:

$$\|s\|_\infty = \sup\{|s_n| \mid n \in \mathbf{N}\}$$

Ekkor a

$$H := \{s \in \ell_\infty(\mathbf{R}) \mid \|s\| \leq 1\}$$

"<http://wiki.math.bme.hu/gomb>" <http://wiki.math.bme.hu> nem kompakt. Hasonló furcsaságokat jelentkeznek a p-edik hatványon szummálható sorozatok  $\ell_p(\mathbf{R})$  terében is. Számunkra esetleg a véges sorösszeggel rendelkező  $\ell_1(\mathbf{R})$  tér bír jelentőséggel.